

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Adrisin Tabletten**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Adrisin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Adrisin beachten?
3. Wie ist Adrisin einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Adrisin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Adrisin und wofür wird es angewendet?**

Adrisin ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zur vorbeugenden Behandlung und zur Linderung von Allergiesymptomen wie

- Niesen
- laufende Nase
- tränende Augen
- Hautirritationen

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Adrisin Tabletten werden angewendet bei Kindern ab 3 Monaten und Erwachsenen.

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren soll nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Adrisin beachten?**

**Adrisin darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie **allergisch** gegen Acidum arsenicosum, Acidum formicicum, Acidum sulfuricum , Arctium, Arnica montana, Graphites, Histaminum dihydrochloricum, Ledum palustre, Lycopodium clavatum, Pix liquida, Selenium, Stibium sulfuratum nigrum, Strychnos ignatii, Sulfur, Tellurium metallicum, Thuja occidentalis oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Adrisin einnehmen.

Die homöopathische Therapie von Allergiebeschwerden sollte bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf durch einen homöopathischen Arzt erfolgen.

Bei anhaltenden, neu auftretenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Bei plötzlich auftretenden, heftigen Beschwerden einer Allergie wie zum Beispiel Atembeschwerden oder einem ausgedehnten Hautausschlag muss unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer sofortigen ärztlichen Behandlung bedürfen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Anwendung unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

### **Kinder unter 2 Jahren**

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren soll nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

### **Einnahme von Adrisin zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### **Einnahme von Adrisin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Adrisin hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Adrisin enthält 300mg Laktose**

Bitte nehmen Sie Adrisin erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. Wie ist Adrisin einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

1 Tablette 3-mal täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle ½ - 1 Stunde bis zu 12-mal täglich.

Nach Besserung der Beschwerden kann zur Vorbeugung eine Weiterbehandlung bis zu einer Woche lang mit einer Tablette 3-mal täglich erfolgen.

### **Anwendung bei Kindern**

Kinder 6 bis 11 Jahre

1 Tablette 2-mal täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle 1 - 2 Stunden bis zu 8-mal täglich.

Nach Besserung der Beschwerden kann zur Vorbeugung eine Weiterbehandlung bis zu einer Woche lang mit einer Tablette 2-mal täglich erfolgen.

Kinder 2 bis 5 Jahre

1 Tablette 1-2-mal täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle 1 - 2 Stunden bis zu 6-mal täglich.

Nach Besserung der Beschwerden kann zur Vorbeugung eine Weiterbehandlung bis zu einer Woche lang mit 1-2 Tabletten täglich erfolgen.

Kinder ab 3 Monaten (nur nach Rücksprache mit dem Arzt)

1 Tablette täglich

In akuten Fällen: 1 Tablette alle 1 - 2 Stunden bis zu 4-mal täglich.

Nach Besserung der Beschwerden kann zur Vorbeugung eine Weiterbehandlung bis zu einer Woche lang mit einer Tablette 1-mal täglich erfolgen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Tabletten langsam im Mund zergehen lassen.

Bei kleinen Kindern (3 Monate bis 3 Jahre) muss die Tablette zerdrückt und mit etwas Wasser vermischt verabreicht werden.

Es wird empfohlen, ab 30 Minuten vor, bis 30 Minuten nach der Einnahme der Tabletten alles zu unterlassen, was die Aufnahme des Arzneimittels beeinträchtigen könnte (wie z.B. Essen, Trinken, Rauchen, Zähneputzen oder Kaugummikauen).

### **Wenn Sie eine größere Menge von Adrisin eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

### **Wenn Sie die Einnahme von Adrisin vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Vorübergehende allergische Reaktionen können auftreten. Angaben zur Häufigkeit des Auftretens dieser Nebenwirkungen können nicht gemacht werden.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 Wien  
ÖSTERREICH  
Fax: +43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Adrisin aufzubewahren?**

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nach dem ersten Öffnen nicht über 30°C lagern.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 12 Monate

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Adrisin enthält**

Die Wirkstoffe sind:

1 Tablette enthält je 15 mg von

Acidum arsenicosum	D8
Acidum formicicum	D8
Acidum sulfuricum	D22
Arctium	D8
Arnica montana	D6
Graphites	D10
Histaminum dihydrochloricum	D8
Histaminum dihydrochloricum	D12
Histaminum dihydrochloricum	D22

Ledum palustre	D8
Lycopodium clavatum	D6
Pix liquida	D10
Selenium	D12
Stibium sulfuratum nigrum	D10
Strychnos ignatii	D6
Sulfur	D12
Tellurium metallicum	D10
Thuja occidentalis	D6

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

#### **Wie Adrisin aussieht und Inhalt der Packung**

Adrisin sind weiße bis gelbweiße, runde, beidseits abgeflachte Tabletten in Tablettendosen mit einem Stopfen aus Kunststoff.

Eine Packung enthält 50 Tabletten.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

##### Zulassungsinhaber und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
 Dr.-Reckeweg-Straße 2 - 4  
 76532 Baden-Baden, Deutschland

##### Vertrieb:

Schwabe Austria GmbH  
 Richard-Strauss-Straße 13  
 1230 Wien, Österreich

**Z. Nr.:337459**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2019.**