

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Combudoron Gel

Wirkstoffe: Arnica montana, planta tota (Urtinktur), Urtica urens (Urtinktur)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angeführt sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Combudoron Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Combudoron Gel beachten?
3. Wie ist Combudoron Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Combudoron Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Combudoron Gel und wofür wird es angewendet?

Combudoron Gel ist eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades, Verbrühungen
z.B. Rötung, Schwellungen, Blasenbildung
- Sonnenbrand
- akute Strahlenschäden der Haut
z.B. Reizung und Verletzung der Haut nach Bestrahlung
- Insektenstiche

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Combudoron Gel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr.

Bei Verbrennungen, die Kinder unter 6 Jahren betreffen, ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Combudoron Gel beachten?

Zur Erstversorgung bei Verbrennungen die entsprechenden Hautpartien sofort unter kaltem Wasser kühlen, bis der Schmerz abklingt, jedoch nicht mehr als 15 Minuten lang. Für die anschließende Versorgung wird Combudoron Gel direkt auf die Haut aufgetragen. Wichtig ist eine sofortige und wiederholte Behandlung der betroffenen Hautstellen.

Wichtiger Hinweis:

Eine sofortige ärztliche Behandlung ist erforderlich bei Verbrennungen:

- mit offenen Wunden
- mit anhaftender Kleidung
- bei großflächigen Verbrennungen (mehr als 10 cm², ungefähr 3 x 3 cm)
- wenn Hände, Gesicht oder Genitalbereich betroffen sind
- wenn die Hautfalten großer Gelenke betroffen sind wie Ellbogen, Achselhöhlen, Knie oder Leiste
- wenn Kinder unter 6 Jahren betroffen sind.

In diesen Fällen suchen Sie Ihren Arzt oder die nächstgelegene Notfallaufnahme auf.

Combudoron Gel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Arnika oder andere Korbblütler, gegen die Kleine Brennnessel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile sind.
- auf offenen Wunden

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Combudoron Gel anwenden.

Der Kontakt des Gels mit Augen und Schleimhäuten (z.B. Mund, Nase, Genitalien) sollte vermieden werden.

Wenn sich Ihr Gesamtzustand verschlechtert (z.B. vermehrt Schmerzen, Fieber, eine Entzündung der umgebenden Haut oder eine Infektion hinzukommen), sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Anwendung von Combudoron Gel mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Daten zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die

Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie ist Combudoron Gel anzuwenden?

Wenden Sie Combudoron Gel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 1 Jahr:
mehrmals täglich

Bei Verbrennungen, die Kinder unter 6 Jahren betreffen, ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Art der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Das Gel auf die betroffenen Hautstellen dünn auftragen und antrocknen lassen. Die Anwendung wiederholen, wenn das Gel trocken ist oder Schmerzen wiederauftreten.

Wichtig ist die sofortige und anhaltende Behandlung der Wundstellen, die Anwendung ist bis zum Abklingen der Beschwerden zu wiederholen.

Der Gelfilm lässt sich leicht mit lauwarmem Wasser abspülen.

Wenn das Anlegen eines Verbandes notwendig ist, diesen nur auf das bereits angetrocknete Gel bringen.

Dauer der Anwendung

Combudoron Gel wird angewendet, solange die akuten Beschwerden anhalten.

Die Nachbehandlung von Verbrennungen kann mit Combudoron Salbe fortgesetzt werden.

In der Regel sollte eine vollständige Abheilung innerhalb von 2 Wochen erfolgt sein. Sollten Komplikationen bei der Wundheilung auftreten (z.B. offene Brandblasen, zunehmende Schmerzen, zunehmendes Spannungsgefühl oder Fieber), oder sollte innerhalb von 7 Tagen keine wesentliche Besserung eintreten, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Wenn Sie eine größere Menge von Combudoron Gel angewendet haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Combudoron Gel vergessen haben

Verwenden Sie nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (weniger als 1 von 10 000 Behandelten) können allergische Hautreaktionen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN, ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Combudoron Gel aufzubewahren?

Nicht über 30°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum (Verwendbar bis:) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 6 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Combudoron Gel enthält

10 g enthalten:

- Wirkstoffe: Arnica montana, planta tota Ø 0,05 g / Urtica urens Ø 0,95 g
- Die sonstigen Bestandteile sind: Xanthangummi, Glycerol 85%, Ethanol 96%, gereinigtes Wasser

Gesamtethanolgehalt ca. 16 Gew.-%

Wie Combudoron Gel aussieht und Inhalt der Packung

Combudoron Gel ist ein hellbraunes Gel in einer Aluminiumtube mit Innenschutzlack und Kunststoffverschluss in einem Faltkarton.

Öffnen des Tubenverschlusses mit Dorn im Schraubverschluss.

Packungsgrößen: 25 g und 70 g

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer: Weleda Ges.m.b.H. & Co KG

Hosnedlgasse 27, A-1220 Wien

Tel.-Nr.: 01 256 60 60, E-Mail: dialog@weleda.at

Hersteller: Weleda AG
Möhlerstraße 3-5, D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

Z.-Nr.: 3-00495

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2017.